


## Les erreurs à ne pas commettre

- Ne pas augmenter les doses sans en parler au médecin.
- Si vous êtes enceinte, signalez-le au médecin, certains antidouleurs sont formellement contre indiqués.
- La prise de certains anti-douleurs n'est pas compatible avec la conduite. Reportez-vous au pictogramme sur l'emballage. Parlez en a votre médecin.



L'équipe soignante mettra en œuvre  
**tous les moyens**

à sa disposition pour soulager votre douleur, même s'il  
n'est pas possible de garantir l'absence totale de douleur.

L'équipe soignante est là  
pour vous écouter et vous aider

# PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POST-OPERATOIRE

Dans cet établissement, nous nous engageons à  
prendre en charge votre DOULEUR.



Suite à votre intervention un protocole antalgique (association de médicaments actifs contre la douleur) va être établi en première intention. Celui-ci contient du paracétamol et des anti-inflammatoires (si bien tolérés par le patient).

Les premières 24 heures le traitement est administré par voie veineuse, puis le relais se fera par voie orale.

En cas de douleur persistante, un protocole composé de morphiniques vous sera proposé.

Ce traitement est administré soit oralement (majoritairement), soit en injection.

Un protecteur gastrique vous sera aussi prescrit tout au long de votre séjour pour protéger votre estomac.

### Effets secondaires des antalgiques :


Ces traitements proposés peuvent entraîner quelques fois à court ou long terme des effets secondaires, exemples : douleurs gastriques, nausées, vomissements, démangeaisons, ...

A l'apparition de ces symptômes il est **fortement recommandé** d'en informer le personnel soignant afin que des dispositions soient prises.


## Evaluation de la douleur



Echelles pour les enfants de 4 à 10 ans :



Echelle d'évaluation de la douleur de l'adulte utilisée dans l'établissement :



L'équipe soignante vous demandera de **situer** sur cette échelle, le **niveau d'intensité** de votre douleur en plaçant le curseur entre « **pas de douleur** » et « **douleur maximale imaginable** » ; en indiquant verbalement ou par écrit un niveau d'intensité compris entre **0 et 10**.

**Il est inutile de mettre la réglette au maximum pour avoir des calmants, car ceux-ci sont adaptés à votre niveau de douleur.**